

TABELLE E DIDASCALIE

| RICHIESTE | MASCHI | | FEMMINE | | TOTALE | |
|--------------------|--------|---------------|---------|---------------|--------|----------------|
| | N° | % | N° | % | N° | % |
| DROP OUT | 2 | 9,1 | 18 | 15,3 | 20 | 14,3 |
| BATTERIE PERVENUTE | 20 | 80,9 | 100 | 84,7 | 120 | 85,7 |
| COUNSELING TOTALE | 22 | 100,0 15,7 | 118 | 100,0 84,3 | 140 | 100,0 100,0 |

Tab 1. Analisi totale della domanda (Counseling totale)

| RICHIESTE | MASCHI | | FEMMINE | | TOTALE | |
|-------------------|--------|---------------|---------|---------------|--------|----------------|
| | N° | % | N° | % | N° | % |
| SINTOMI SOMATICI | 3 | 15,0 | 37 | 37,0 | 40 | 33,3 |
| SINTOMI PSICHICI | 7 | 35,0 | 53 | 53,0 | 60 | 50,0 |
| TERAPIA DI COPPIA | 10 | 50,0 | 10 | 10,0 | 20 | 16,7 |
| TOTALE | 20 | 100,0 16,7 | 100 | 100,0 83,3 | 120 | 100,0 100,0 |

Tab 2. Analisi della domanda del campione esaminato distinto per sintomatologia in base alla richiesta di intervento

| ETÀ DOMANDA | < 25 ANNI | | 25-34 ANNI | | 35-44 ANNI | | > 44 ANNI | | ETÀ MEDIA ANNI ± DS | | TOTALE | |
|-------------------|-----------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------------|-------|--------|----------------|
| | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % | | | N° | % |
| SINTOMI PSICHICI | 12 | 70,5 20,0 | 21 | 43,7 35,0 | 19 | 47,5 31,7 | 8 | 53,3 13,3 | 33,68 | 10,09 | 60 | 50,0 100,0 |
| SINTOMI SOMATICI | 4 | 23,5 10,0 | 19 | 39,6 47,5 | 11 | 27,5 27,5 | 6 | 40,0 15,0 | 34,70 | 9,25 | 40 | 33,3 100,0 |
| TERAPIA DI COPPIA | 1 | 6,0 5,0 | 8 | 16,7 40,0 | 10 | 25,0 50,0 | 1 | 6,7 5,0 | 34,55 | 5,94 | 20 | 16,7 100,0 |
| TOTALE | 17 | 100,0 14,2 | 48 | 100,0 40,0 | 40 | 100,0 33,3 | 15 | 100,0 12,5 | 34,47 | 9,19 | 120 | 100,0 100,0 |

Tab 3. Analisi della domanda per fasce d'età ed età media del campione esaminato

| CONNOTATI | | MASCHI | | FEMMINE | | TOTALE | |
|------------------|-----------------------------------|--------|------|---------|------|--------|-------|
| | | N° | % | N° | % | N° | % |
| SESSO | | 20 | 16,7 | 100 | 83,3 | 120 | 100,0 |
| STATO CIVILE | CELIBE / NUBILE | 6 | 30,0 | 36 | 36,0 | 42 | 35,0 |
| | CONIUGATO / CONIUGATA | 13 | 65,0 | 47 | 47,0 | 60 | 50,0 |
| | VEDOVO / VEDOVA | 0 | 0 | 4 | 4,0 | 4 | 3,3 |
| | SEPARATO / SEPARATA | 1 | 5,0 | 9 | 9,0 | 10 | 8,4 |
| | DIVORZIATO / DIVORZIATA | 0 | 0 | 4 | 4,0 | 4 | 3,3 |
| TITOLO DI STUDIO | LICENZA ELEMENTARE | 0 | 0,0 | 5 | 5,0 | 5 | 4,2 |
| | SCUOLA MEDIA INFERIORE | 6 | 30,0 | 43 | 43,0 | 49 | 40,8 |
| | SCUOLA MEDIA SUPERIORE | 14 | 70,0 | 44 | 44,0 | 58 | 48,3 |
| | DIPLOMA O LAUREA UNIVERSITARIA | 0 | 0,0 | 8 | 8,0 | 8 | 6,7 |
| PROFESSIONE | DISOCCUPATI | 1 | 5,0 | 10 | 10,0 | 11 | 9,2 |
| | IMPIEGATI | 11 | 55,0 | 38 | 38,0 | 49 | 40,8 |
| | CASALINGHE | 0 | 0,0 | 9 | 9,0 | 9 | 7,5 |
| | OPERAI-AGRIGOLTORI | 3 | 15,0 | 19 | 19,0 | 22 | 18,3 |
| | INSEGNANTI | 1 | 5,0 | 6 | 6,0 | 7 | 5,8 |
| | STUDENTI | 0 | 0,0 | 6 | 6,0 | 6 | 5,0 |
| | ARTIGIANI - LIBERI PROFESSIONISTI | 4 | 20,0 | 12 | 12,0 | 16 | 13,4 |

Tab 4. Connotati socio – demografici – culturali dell’utenza

| SESSO | | MASCHI | | FEMMINE | | TOTALE | |
|---------------------------|-----------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|-------|
| RICHIESTA DI INTERVENTO * | | N° | % | N° | % | N° | % |
| SINTOMI PSICHICI | | 7 | 35,0 | 53 | 53,0 | 60 | 50,0 |
| | | | 11,7 | | 88,3 | | 100,0 |
| SINTOMI SOMATICI | Apparato Urogenitale | 0 | 0,0 | 20 | 20,0 | 20 | 16,7 |
| | Apparato Gastrointestinale | 2 | 10,0 | 7 | 7,0 | 9 | 7,5 |
| | SNC-Periferico-Fibromialgie | 1 | 5,0 | 10 | 10,0 | 11 | 9,1 |
| | TOTALE | 3 | 15,0 | 37 | 37,0 | 40 | 33,3 |
| | | | 7,5 | | 92,5 | | 100,0 |
| TERAPIA DI COPPIA | | 10 | 50,0 | 10 | 10,0 | 20 | 16,7 |
| | | | 50,0 | | 50,0 | | 100,0 |
| TOTALE | | 20 | 100,0 | 100 | 100,0 | 120 | 100,0 |
| | | | 16,7 | | 83,3 | | 100,0 |

Tab 5. Utenza suddivisa per appartenenza sessuale e tipo di disturbo (* $p < 0,001$)

| UTENTI MOTIVAZIONI * | SINTOMI PSICHICI | | SINTOMI SOMATICI | | TERAPIA DI COPPIA | | TOTALE | |
|--|------------------|-------|------------------|-------|-------------------|-------|--------|-------|
| | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % |
| Perché ritengo di avere dei problemi psicologici che vorrei affrontare | 43 | 71,7 | 16 | 40,0 | 6 | 30,0 | 65 | 54,2 |
| | | 66,2 | | 24,6 | | 9,2 | | 100,0 |
| Perché voglio conoscere meglio alcune mie caratteristiche psicologiche | 9 | 15,0 | 16 | 40,0 | 7 | 35,0 | 32 | 26,7 |
| | | 28,1 | | 50,0 | | 21,9 | | 100,0 |
| Per una richiesta di collaborazione | 6 | 10,0 | 6 | 15,0 | 7 | 35,0 | 19 | 15,8 |
| | | 31,6 | | 31,6 | | 36,8 | | 100,0 |
| Non so bene perché debba rispondere a questo questionario | 2 | 3,3 | 2 | 5,0 | 0 | 0,0 | 4 | 3,3 |
| | | 50,0 | | 50,0 | | 0,0 | | 100,0 |
| TOTALE | 60 | 100,0 | 40 | 100,0 | 20 | 100,0 | 120 | 100,0 |
| | | 50,0 | | 33,3 | | 16,7 | | 100,0 |

Tab 6. Motivazioni della richiesta di intervento terapeutico (* $p < 0,01$)

| UTENTI* APPROCCIO TERAPEUTICO | SINTOMI PSICHICI | | SINTOMI SOMATICI | | TERAPIA DI COPPIA | | TOTALE | |
|---|------------------|-------|------------------|-------|-------------------|-------|--------|-------|
| | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % |
| PSICOTERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE | 2 | 3,3 | 0 | 0,0 | 4 | 20,0 | 6 | 5,0 |
| PSICOTERAPIA COGNIT.-COMPORT. + TERAPIA BIOLOGICA | 18 | 30,0 | 7 | 17,5 | 8 | 40,0 | 33 | 27,5 |
| PSICOTERAPIA COGNIT.-COMPORT. + TERAPIA BIOLOGICA + PSICOTER. A INTEGRAZ. CORPOR. | 40 | 66,7 | 33 | 82,5 | 8 | 40,0 | 81 | 67,5 |
| TOTALE | 60 | 100,0 | 40 | 100,0 | 20 | 100,0 | 120 | 100,0 |
| | | 50,0 | | 33,3 | | 16,7 | | 100,0 |

Tab 7. Diversità dell'approccio terapeutico nei tre gruppi di utenza (* $p < 0,01$)

| APPROCCIO TERAPEUTICO COLLABORAZIONE TERAPEUTICA * | PSICOTERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENT. | | PSICOTERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENT. + TERAPIA BIOLOGICA | | PSICOTERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENT. + TERAPIA BIOLOGICA + PSICOTERAPIA A INTEGRAZIONE CORPOREA | | TOTALE | |
|---|--------------------------------------|-------|--|-------|---|-------|--------|-------|
| | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % |
| DROP-OUT POST-RELAZIONE PSICOMETRICA | 4 | 66,6 | 6 | 18,2 | 0 | 0,0 | 10 | 8,3 |
| TERAPIA NON COLLABORANTE | 1 | 16,7 | 17 | 51,5 | 17 | 21,0 | 35 | 29,2 |
| TERAPIA COLLABORANTE | 1 | 16,7 | 10 | 30,3 | 64 | 79,0 | 75 | 62,5 |
| TOTALE | 6 | 100,0 | 33 | 100,0 | 81 | 100,0 | 120 | 100,0 |
| | | 5,0 | | 27,5 | | 67,5 | | 100,0 |

Tab 8. Correlazione tra tipo di approccio terapeutico e la collaborazione terapeutica ottenuta dall'utenza (* $p < 0,001$)

| SCALE M.M.P.I. ASPETTI PSICO-FISIOLOGICI | | Hs | D | Hy | Pd | Mf | Pa | Pt | Sc | Ma | Si | Media | In.PsicoPat | In.Ansia | In.Psicosi | In.Nevrosi | Aggressività | Forza Io |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|
| UTENTI | PSICOLOGICI PSICOSOMATICI RELAZIONALI | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,01 | p < 0,025 | p < 0,001 | p < 0,01 | p < 0,001 | p < 0,01 | N.S. | N.S. | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,001 | N.S. | p < 0,001 |
| SESSO | MASCHI FEMMINE | p < 0,05 | p < 0,01 | N.S. | N.S. | p < 0,001 | p < 0,01 | p < 0,05 | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,025 | p < 0,05 | p < 0,01 | p < 0,001 | N.S. | p < 0,01 |
| VARIAZIONI RILEVANTI NEGLI ULTIMI 12 MESI | PERSON./FAM. ECONOM./LAV. LOGIST./ABIT. | N.S. | N.S. | p < 0,01 | p < 0,05 | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,01 | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,025 | N.S. | N.S. |
| RIPOSO NOTTURNO | SCARSO INSUFFICIENTE BUONO | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,01 | N.S. | p < 0,01 | p < 0,001 | p < 0,025 | N.S. | N.S. | p < 0,001 | p < 0,01 | p < 0,001 | p < 0,01 | p < 0,001 | p < 0,05 | p < 0,001 |
| QUALITÀ DEL RIPOSO | OTTIMO, DISCRETO, DISTURBATO, MOLTO DISTURBATO | p < 0,01 | p < 0,01 | p < 0,01 | p < 0,001 | N.S. | p < 0,01 | p < 0,001 | p < 0,01 | p < 0,05 | N.S. | p < 0,001 | p < 0,01 | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,05 | p < 0,05 |
| ESPERIENZE TRAUMATICHE | SI NO | N.S. | p < 0,01 | p < 0,01 | p < 0,001 | N.S. | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,001 | N.S. | N.S. | p < 0,001 | p < 0,01 | p < 0,001 | p < 0,01 | p < 0,01 | N.S. | p < 0,01 |
| TIPO DI TRAUMI | PSICOLOGICI RELAZIONALI | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,05 | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,05 | N.S. |
| APPROCCIO TERAPEUTICO | PSIC.T.COGL.COMP. PSIC.T.+TER.BIOL. PSINT.COR.+T.B. | p < 0,01 | N.S. | N.S. | p < 0,025 | p < 0,001 | N.S. | N.S. | p < 0,05 | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. |
| COLLABOR. TERAPEUTICA | DROP-OUT POST-R TER.NON COLLAB. TER.COLLABOR. | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,05 | N.S. | N.S. | p < 0,01 | N.S. | N.S. | p < 0,05 | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,05 | N.S. | N.S. | N.S. |

Tab 9a Valutazione delle variazioni significative nei punteggi delle scale psicometriche (M.M.P.I.) rispetto agli aspetti psicofisiologici analizzati

| SCALE P.A.R.I.-LÜSCHER- M.A.S. - S.D.S. - Q.E. ASPETTI PSICO-FISIOLOGICI | | ATT.MARTIRE | CONF.CONIU. | IRRITAB.PAR. | REPRE.AGGR. | RIF.RDO.CAS. | TRSCUR.PART. | LÜSCHER | M.A.S | S.D.S | COSCIENDI SE | ESPRESSE.MO. | AUTONOMIA | AUTOSTIMA | CAPA.RELAZ. | CAP.ASCOLTO | Q.E. MEDIA |
|---|---|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------|-----------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|
| UTENTI | PSICOLOGICI PSICOSOMATICI RELAZIONALI | N.S. | p < 0,01 | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,001 | p < 0,001 | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. |
| SESSO | MASCHI FEMMINE | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,025 | p < 0,025 | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. |
| VARIAZIONI RILEVANTI NEGLI ULTIMI 12 MESI | PERSON./FAM. ECONOM./LAV. LOGIST./ABIT. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,01 | p < 0,05 | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. |
| RIPOSO NOTTURNO | SCARSO INSUFFICIENTE BUONO | N.S. | N.S. | p < 0,05 | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,001 | p < 0,001 | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. |
| QUALITÀ DEL RIPOSO | OTTIMO, DISCRETO, DISTURBATO, MOLTO DISTURBATO | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,001 | p < 0,001 | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,001 | p < 0,001 | N.S. | N.S. |
| ESPERIENZE TRAUMATICHE | SI NO | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,01 | p < 0,001 | N.S. | N.S. | p < 0,05 | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. |
| TIPO DI TRAUMI | PSICOLOGICI RELAZIONALI | N.S. | N.S. | p < 0,025 | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. |
| APPROCCIO TERAPEUTICO | PSIC.T.COGL.COMP. PSIC.T.+TER.BIOL PSLINT.COR.+T.B. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,025 |
| COLLABOR. TERAPEUTICA | DROP-OUT POST-R TER.NON COLLAB. TER.COLLABOR. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,05 | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,05 | N.S. | p < 0,025 | N.S. |

Tab 9b. Valutazione delle variazioni significative nei punteggi delle scale psicometriche (P.A.R.I.-LÜSCHER-M.A.S.-S.D.S.-Q.E.) rispetto agli aspetti psicofisiologici analizzati

| SCALE M.M.P.I. ASPETTI SOCIO-RELAZIONALI | | Hs | D | Hy | Pd | Mf | Pa | Pt | Sc | Ma | Si | Media | In.Psicopat | In.Ansia | In.Piticosi | In.Nevrosi | Aggressività | Forza Io |
|--|---|------|------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-------------|----------|-------------|------------|--------------|----------|
| QUALITÀ RELAZIONE | BUONA CONFLITTUALE PESSIMA | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,01 | N.S. | N.S. | p < 0,025 | p < 0,025 | N.S. | N.S. | p < 0,025 | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,05 |
| DURATA RELAZIONE | < 3 ANNI, 4-10 ANNI, > 10 ANNI | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,05 | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,05 | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. |
| ETÀ PRIMO RAPPORTO | < 17 ANNI, 17-18 ANNI, > 18 ANNI | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,01 | p < 0,025 | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,05 | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. |
| ESPERIENZA POSITIVA ? | SI NO | N.S. | N.S. | p < 0,05 | p < 0,05 | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. |
| SESSUALITÀ | ASSENTE PROBLEMATICA OTTIMA - BUONA | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,001 | N.S. | p < 0,025 | p < 0,01 | p < 0,01 | N.S. | N.S. | p < 0,05 | N.S. | p < 0,05 | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. |
| ATTIVITÀ SESSUALE | RICERCATI SUBITI RIFIUTATI | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. |
| RAGGIUNGIMENTO DELL'ORGASMO | SCARSO SUFFICIENTE COSTANTE | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,025 | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. |
| RELAZIONI LAVORATIVE | PESSIME CONFLITTUALI POSITIVE | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,05 | N.S. | p < 0,025 | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,01 |
| GRATIFICAZIONE LAVORATIVA | SCARSA DISCRETA AMPIA | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,05 | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. |

Tab 10a. Valutazione delle variazioni significative nei punteggi delle scale psicometriche (M.M.P.I.) rispetto agli aspetti relazionali analizzati

| SCALE P.A.R.I.-LÜSCHER- M.A.S. - S.D.S. - Q.E. ASPETTI SOCIO-RELAZIONALI | | ATT.MARTIRE | CONF.CONIU. | IRRTAB.PAR. | REPRE.AGGR. | RIE.RUC.CAS. | TRSCUR.PART | LÜSCHER | M.A.S | S.D.S | COSCI.DI.SÈ | ESPRE.EMIO. | AUTONOMIA | AUTOSTIMA | CAPARELAZ. | CAP.ASCOLTO | Q.E. MEDIA |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------|----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|
| QUALITÀ RELAZIONE | BUONA CONFLITTUALE PESSIMA | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,05 | p < 0,05 | p < 0,025 | N.S. | N.S. | p < 0,01 | N.S. | N.S. | p < 0,05 | N.S. | p < 0,01 | N.S. | p < 0,05 |
| DURATA RELAZIONE | < 3 ANNI, 4-10 ANNI, > 10 ANNI | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,01 | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. |
| ETÀ PRIMO RAPPORTO | < 17 ANNI, 17-18 ANNI, > 18 ANNI | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. |
| ESPERIENZA POSITIVA ? | SI NO | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,05 | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. |
| SESSUALITÀ | ASSENTE PROBLEMATICA OTTIMA - BUONA | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. |
| ATTIVITÀ SESSUALE | RICERCATI SUBITI RIFIUTATI | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,025 | N.S. | N.S. | N.S. |
| RAGGIUNGIMENTO DELL'ORGASMO | SCARSO SUFFICIENTE COSTANTE | p < 0,025 | N.S. | p < 0,05 | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,01 | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,01 | N.S. | p < 0,01 |
| RELAZIONI LAVORATIVE | PESSIME CONFLITTUALI POSITIVE | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,05 | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,025 | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. |
| GRATIFICAZIONE LAVORATIVA | SCARSA DISCRETA AMPIA | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. |

Tab 10b. Valutazione delle variazioni significative nei punteggi delle scale psicometriche (P.A.R.I.-LÜSCHER-M.A.S.-S.D.S.-Q.E.) rispetto agli aspetti relazionali analizzati

| UTENTI QUALITÀ DEL SONNO * | UTENTI PSICHICI | | UTENTI SOMATICI | | UTENTI RELAZION. | | TOTALE | |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|--------|----------------|
| | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % |
| DISTURBI NOTTURNI ASSENTI (< 2 punti) | 12 | 20,0 40,0 | 17 | 42,5 56,7 | 1 | 5,0 3,3 | 30 | 25,0 100,0 |
| DISTURBI NOTTURNI LIEVI (2-4 punti) | 23 | 38,4 43,4 | 16 | 40,0 30,2 | 14 | 70,0 26,4 | 53 | 44,2 100,0 |
| DISTURBI NOTTURNI DISCRETI (5-7 punti) | 14 | 23,3 56,0 | 6 | 15,0 24,0 | 5 | 25,0 20,0 | 25 | 20,8 100,0 |
| DISTURBI NOTTURNI GRAVI (>7 punti) | 11 | 18,3 91,7 | 1 | 2,5 8,3 | 0 | 0,0 0,0 | 12 | 10,0 100,0 |
| TOTALE | 60 | 100,0 50,0 | 40 | 100,0 33,3 | 20 | 100,0 16,7 | 120 | 100,0 100,0 |

Tab 11. Analisi dell'utenza e della qualità del sonno riscontrata (*p<0,01)

| UTENTI STATO CIVILE * | UTENTI PSICHICI | | UTENTI SOMATICI | | UTENTI RELAZION. | | TOTALE | |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|--------|----------------|
| | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % |
| CELIBE - NUBILE | 28 | 46,7 66,7 | 11 | 27,5 26,2 | 3 | 15,0 7,1 | 42 | 35,0 100,0 |
| VEDOVO - VEDOVA SEPARATO - SEPARATA DIVORZIATO - DIVORZIATA | 11 | 18,3 61,1 | 5 | 12,5 27,8 | 2 | 10,0 11,1 | 18 | 15,0 100,0 |
| CONIUGATO - CONIUGATA | 21 | 35,0 35,0 | 24 | 60,0 40,0 | 15 | 75,0 25,0 | 60 | 50,0 100,0 |
| TOTALE | 60 | 100,0 50,0 | 40 | 100,0 33,3 | 20 | 100,0 16,7 | 120 | 100,0 100,0 |

Tab 12. Analisi dell'utenza rispetto allo stato civile (*p<0,025)

| <u>UTENTI</u> LAVORO * | UTENTI PSICHICI | | UTENTI SOMATICI | | UTENTI RELAZION. | | TOTALE | |
|--|-----------------|-------|-----------------|-------|------------------|-------|--------|-------|
| | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % |
| IMPIEGATO / A | 24 | 40,0 | 18 | 45,0 | 7 | 35,0 | 49 | 40,9 |
| | | 49,0 | | 36,7 | | 14,3 | | 100,0 |
| CASALINGA STUDENTE | 14 | 23,3 | 1 | 2,5 | 0 | 0,0 | 15 | 12,5 |
| | | 93,3 | | 6,7 | | 0,0 | | 100,0 |
| AGRICOLTORE OPERAIO / A | 10 | 16,7 | 6 | 15,0 | 6 | 30,0 | 22 | 18,3 |
| | | 45,4 | | 27,3 | | 27,3 | | 100,0 |
| ARTIGIANO / A LIBERO PROFESSIONISTA | 5 | 8,3 | 6 | 15,0 | 5 | 25,0 | 16 | 13,3 |
| | | 31,25 | | 37,5 | | 31,25 | | 100,0 |
| INSEGNANTE | 0 | 0,0 | 5 | 12,5 | 2 | 10,0 | 7 | 5,8 |
| | | 0,0 | | 71,4 | | 28,6 | | 100,0 |
| DISOCCUPATO / A | 7 | 11,7 | 4 | 10,0 | 0 | 0,0 | 11 | 9,2 |
| | | 63,6 | | 36,4 | | 0,0 | | 100,0 |
| TOTALE | 60 | 100,0 | 40 | 100,0 | 20 | 100,0 | 120 | 100,0 |
| | | 50,0 | | 33,3 | | 16,7 | | 100,0 |

Tab 13. Analisi dell'utenza rispetto alla professione espletata (* $p < 0,01$)

| <u>SESSO</u> GRATIFICAZIONE LAVORO * | MASCHI | | FEMMINE | | TOTALE | |
|---|--------|-------|---------|-------|--------|-------|
| | N° | % | N° | % | N° | % |
| MOLTO APPAGANTE – GRATIFICANTE | 4 | 20,0 | 19 | 19,0 | 23 | 19,2 |
| | | 17,4 | | 82,6 | | 100,0 |
| MODERATAMENTE GRATIFICANTE | 13 | 65,0 | 33 | 33,0 | 46 | 38,3 |
| | | 28,3 | | 71,7 | | 100,0 |
| POCO GRATIFICANTE | 1 | 5,0 | 23 | 23,0 | 24 | 20,0 |
| | | 4,2 | | 95,8 | | 100,0 |
| NESSUN LAVORO | 2 | 10,0 | 25 | 25,0 | 27 | 22,5 |
| | | 7,4 | | 92,6 | | 100,0 |
| TOTALE | 20 | 100,0 | 100 | 100,0 | 120 | 100,0 |
| | | 16,7 | | 83,3 | | 100,0 |

Tab 14. Analisi dell'utenza, suddivisa per sesso, rispetto alla gratificazione lavorativa (* $p < 0,05$)

| <u>SESSO</u> VARIAZIONI RILEVANTI * (NEGLI ULTIMI 12 MESI) | MASCHI | | FEMMINE | | TOTALE | |
|--|--------|-------|---------|-------|--------|-------|
| | N° | % | N° | % | N° | % |
| PERSONALI – FAMILIARI | 6 | 30,0 | 47 | 47,0 | 53 | 44,2 |
| | | 11,3 | | 88,7 | | 100,0 |
| LAVORATIVE – ECONOMICHE | 6 | 30,0 | 9 | 9,0 | 15 | 12,5 |
| | | 40,0 | | 60,0 | | 100,0 |
| LOGISTICO – ABITATIVE | 1 | 5,0 | 17 | 17,0 | 18 | 15,0 |
| | | 5,6 | | 94,4 | | 100,0 |
| NESSUNA VARIAZIONE | 7 | 35,0 | 27 | 27,0 | 34 | 28,3 |
| | | 20,6 | | 79,4 | | 100,0 |
| TOTALE | 20 | 100,0 | 100 | 100,0 | 120 | 100,0 |
| | | 16,7 | | 83,3 | | 100,0 |

Tab 15. Analisi del rapporto tra utenza, suddivisa per sesso, rispetto alla presenza di variazioni significative, nella propria vita, negli ultimi 12 mesi (* $p < 0,05$)

| PUNTEGGI MEDI M.M.P.I. VARIAZIONI RILEVANTI* (NEGLI ULTIMI 12 MESI) | < 51 | | 51-70 | | >70 | | TOTALE | |
|--|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|------------------------|
| | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % |
| PERSONALI – FAMILIARI | 5 | 22,7 9,4 | 32 | 43,3 60,4 | 16 | 66,7 30,2 | 53 | 44,2 100,0 |
| LAVORATIVE – ECONOMICHE | 3 | 13,6 20,0 | 10 | 13,5 66,7 | 2 | 8,3 13,3 | 15 | 12,5 100,0 |
| LOGISTICO – ABITATIVE | 1 | 4,6 5,6 | 12 | 16,2 66,7 | 5 | 20,8 27,7 | 18 | 15,0 100,0 |
| NESSUNA VARIAZIONE | 13 | 59,1 38,2 | 20 | 27,0 58,8 | 1 | 4,2 3,0 | 34 | 28,3 100,0 |
| TOTALE | 22 | 100,0 18,3 | 74 | 100,0 61,7 | 24 | 100,0 20,0 | 120 | 100,0 100,0 |

Tab 16. Analisi dei punteggi medi ottenuti dall'utenza nelle scale del M.M.P.I. rispetto alla presenza di variazioni significative, nella propria vita, negli ultimi 12 mesi (* $p < 0,01$)

| UTENTI QUALITÀ DELLA RELAZIONE CON IL PARTNER* | UTENTI PSICHICI | | UTENTI SOMATICI | | UTENTI RELAZION. | | TOTALE | |
|---|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------|------------------------|
| | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % |
| OTTIMA – BUONA | 19 | 31,7 40,4 | 24 | 60,0 51,1 | 4 | 20,0 8,5 | 47 | 39,2 100,0 |
| DISCRETA – CONFLITTUALE | 18 | 30,0 56,3 | 8 | 20,0 25,0 | 6 | 30,0 18,7 | 32 | 26,7 100,0 |
| AVVILENTE - PESSIMA | 7 | 11,7 38,9 | 2 | 5,0 11,1 | 9 | 45,0 50,0 | 18 | 15,0 100,0 |
| SINGLE | 16 | 26,6 69,6 | 6 | 15,0 26,1 | 1 | 5,0 4,3 | 23 | 19,1 100,0 |
| TOTALE | 60 | 100,0 50,0 | 40 | 100,0 33,3 | 20 | 100,0 16,7 | 120 | 100,0 100,0 |

Tab 17. Analisi della qualità della relazione con il partner rispetto al tipo di utenza (* $p < 0,001$)

| UTENTI SESSUALITÀ* | UTENTI PSICHICI | | UTENTI SOMATICI | | UTENTI RELAZION. | | TOTALE | |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------|------------------------|
| | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % |
| OTTIMA – BUONA | 22 | 36,7 44,9 | 21 | 52,5 42,9 | 6 | 30,0 12,2 | 49 | 40,8 100,0 |
| PROBLEMATICA E NON SODDISFACENTE | 7 | 11,7 38,9 | 8 | 20,0 44,4 | 3 | 15,0 16,7 | 18 | 15,0 100,0 |
| AVVILENTE - PESSIMA PRESSOCHÈ ASSENTE | 30 | 50,0 63,8 | 6 | 15,0 12,8 | 11 | 55,0 23,4 | 47 | 39,2 100,0 |
| MAI ESERCITATA | 1 | 1,6 16,7 | 5 | 12,5 83,3 | 0 | 0,0 0,0 | 6 | 5,0 100,0 |
| TOTALE | 60 | 100,0 50,0 | 40 | 100,0 33,3 | 20 | 100,0 16,7 | 120 | 100,0 100,0 |

Tab 18. Analisi della qualità della attività sessuale con il partner rispetto al tipo di utenza (* $p < 0,01$)

| <u>UTENTI</u> DISTURBI DELLA SESSUALITÀ* | UTENTI PSICHICI | | UTENTI SOMATICI | | UTENTI RELAZION. | | TOTALE | |
|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|------------------------------|
| | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % |
| NESSUN DISTURBO | 30 | 50,0 57,7 | 14 | 35,0 26,9 | 8 | 40,0 15,4 | 52 | 43,3 100,0 |
| RELATIVI ALL'ATTO SESSUALE | 18 | 30,0 46,2 | 18 | 45,0 46,2 | 3 | 15,0 7,6 | 39 | 32,5 100,0 |
| RELATIVI AL PARTNER SESSUALE | 6 | 10,0 40,0 | 3 | 7,5 20,0 | 6 | 30,0 40,0 | 15 | 12,5 100,0 |
| NESSUNA RISPOSTA | 6 | 10,0 42,9 | 5 | 12,5 35,7 | 3 | 15,0 21,4 | 14 | 11,7 100,0 |
| TOTALE | 60 | 100,0 50,0 | 40 | 100,0 33,3 | 20 | 100,0 16,7 | 120 | 100,0 100,0 |

Tab 19. Presenza di disturbi nella attività sessuale con il partner rispetto al tipo di utenza (* $p < 0,025$)

| <u>SESSO</u> DISTURBI DELLA SESSUALITÀ* | MASCHI | | FEMMINE | | TOTALE | |
|--|-----------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------------------------|
| | N° | % | N° | % | N° | % |
| NESSUN DISTURBO | 9 | 45,0 17,3 | 43 | 43,0 82,7 | 52 | 43,3 100,0 |
| RELATIVI ALL'ATTO SESSUALE | 3 | 15,0 7,7 | 36 | 36,0 92,3 | 39 | 32,5 100,0 |
| RELATIVI AL PARTNER SESSUALE | 7 | 35,0 46,7 | 8 | 8,0 53,3 | 15 | 12,5 100,0 |
| NESSUNA RISPOSTA | 1 | 5,0 7,1 | 13 | 13,0 92,9 | 14 | 11,7 100,0 |
| TOTALE | 20 | 100,0 16,7 | 100 | 100,0 83,3 | 120 | 100,0 100,0 |

Tab 20. Confronto rispetto al tipo di sesso di appartenenza della presenza di disturbi nella attività sessuale (* $p < 0,01$)

| <u>SESSO</u> GRATIFICAZIONE ORGASMICA* | MASCHI | | FEMMINE | | TOTALE | |
|---|-----------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------------------------|
| | N° | % | N° | % | N° | % |
| MAI - RARAMENTE | 2 | 10,0 8,0 | 23 | 23,0 92,0 | 25 | 20,8 100,0 |
| ABBASTANZA SPESSO | 4 | 20,0 8,3 | 44 | 44,0 91,7 | 48 | 40,0 100,0 |
| COSTANTEMENTE | 13 | 65,0 39,4 | 20 | 20,0 60,6 | 33 | 27,5 100,0 |
| NESSUNA RISPOSTA | 1 | 5,0 7,1 | 13 | 13,0 92,9 | 14 | 11,7 100,0 |
| TOTALE | 20 | 100,0 16,7 | 100 | 100,0 83,3 | 120 | 100,0 100,0 |

Tab 21. Confronto rispetto al tipo di sesso di appartenenza della presenza di gratificazione orgasmica nella attività sessuale (* $p < 0,01$)

| <u>UTENTI</u> GRATIFICAZIONE ORGASMICA * | UTENTI PSICHICI | | UTENTI SOMATICI | | UTENTI RELAZION. | | TOTALE | |
|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|------------------------------|
| | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % |
| MAI - RARAMENTE | 18 | 30,0 72,0 | 6 | 15,0 24,0 | 1 | 5,0 4,0 | 25 | 20,8 100,0 |
| ABBASTANZA SPESSO MA NON SEMPRE | 21 | 35,0 43,7 | 20 | 50,0 41,7 | 7 | 35,0 14,6 | 48 | 40,0 100,0 |
| COSTANTEMENTE | 15 | 25,0 45,5 | 8 | 20,0 24,2 | 10 | 50,0 30,3 | 33 | 27,5 100,0 |
| NESSUNA RISPOSTA | 6 | 10,0 42,9 | 6 | 15,0 42,9 | 2 | 10,0 14,2 | 14 | 11,7 100,0 |
| TOTALE | 60 | 100,0 50,0 | 40 | 100,0 33,3 | 20 | 100,0 16,7 | 120 | 100,0 100,0 |

Tab 22. Confronto rispetto al tipo di utenza della presenza di gratificazione orgasmica nella attività sessuale (* $p < 0,025$)

| <u>ETÀ</u> GIUDIZIO | < 17 ANNI | | 17-18 ANNI | | > 18 ANNI | | NESSUNA RISPOSTA | | TOTALE | |
|------------------------|-----------|-----------------------------|------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------|------------------------------|
| | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % |
| ESPERIENZA POSITIVA | 6 | 27,3 9,2 | 29 | 64,4 44,6 | 30 | 66,7 46,2 | 0 | 0,0 0,0 | 65 | 54,2 100,0 |
| ESPERIENZA NEGATIVA | 16 | 72,7 34,0 | 16 | 35,6 34,0 | 15 | 33,3 32,0 | 0 | 0,0 0,0 | 47 | 39,1 100,0 |
| NESSUNA RISPOSTA | 0 | 0,0 0,0 | 0 | 0,0 0,0 | 0 | 0,0 0,0 | 8 | 100,0 100,0 | 8 | 6,7 100,0 |
| TOTALE | 22 | 100,0 18,3 | 45 | 100,0 37,5 | 45 | 100,0 37,5 | 8 | 100,0 6,7 | 120 | 100,0 100,0 |

Tab 23. Confronto tra il giudizio espresso nei riguardi del vissuto del primo rapporto sessuale e l'età in cui lo stesso è avvenuto (* $p < 0,01$)

| <u>UTENTI</u> SOMATIZZAZIONI ALGICHE * | UTENTI PSICHICI | | UTENTI SOMATICI | | UTENTI RELAZION. | | TOTALE | |
|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|------------------------------|
| | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % |
| ASSENTI | 17 | 28,3 60,7 | 5 | 12,5 17,9 | 6 | 30,0 21,4 | 28 | 23,4 100,0 |
| SINGOLO DISTRETTO | 27 | 45,0 58,7 | 13 | 32,5 28,3 | 6 | 30,0 13,0 | 46 | 38,3 100,0 |
| DISTRETTI MULTIPLI | 16 | 26,7 34,8 | 22 | 55,0 47,8 | 8 | 40,0 17,4 | 46 | 38,3 100,0 |
| TOTALE | 60 | 100,0 50,0 | 40 | 100,0 33,3 | 20 | 100,0 16,7 | 120 | 100,0 100,0 |

Tab 24. Analisi della presenza e del grado di distribuzione delle somatizzazioni algiche rispetto al tipo di utenza (* $p < 0,05$)

| SCALE M.M.P.I. SOMATIZZAZIONI ALGICHE | | Hs | D | Hy | Pd | Mf | Pa | Pt | Sc | Ma | Si | Media | In.PsicoPat | In.Ansia | In.Psicosi | In.Nevrosi | Aggressività | Forza Io | |
|--|--|-----------|-----------|------|----------|------|-----------|------|-----------|------|------|-------|-------------|----------|------------|------------|--------------|----------|------|
| SOMATIZZAZIONI | ASSENTI PRESENTI | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,05 | N.S. | N.S. | |
| INTENSITÀ DEL DOLORE | LIEVE MODERATO FORTE | N.S. | p < 0,025 | N.S. | p < 0,05 | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,05 | |
| FREQUENZA DI CONPARSA | OCCASIONALE COSTANTE | p < 0,025 | p < 0,01 | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,025 | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,01 | N.S. | N.S. |
| DISTRETTO INTERESSATO | RACHIDE CERVICALE E ARTI SUPERIORI | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. |
| | RACHIDE DORSALE E LOMBOSACRALE | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. |
| | DISTRETTO ADDOMINALE E PELVICO | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. |
| | ARTI INFERIORI | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. |
| | INTERESSAMENTO GENERALE DI TUTTO IL CORPO O DI PIÙ DISTRETTI | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,025 | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. |

Tab 25a. Analisi della presenza, della intensità, della frequenza di comparsa e della localizzazione delle somatizzazioni algiche rispetto ai punteggi significativi emersi nelle scale psicometriche (M.M.P.I.).

| SCALE P.A.R.I.-LÜSCHER- M.A.S. - S.D.S. - Q.E. SOMATIZZAZIONI ALGICHE | | ATT.MARTIRE | CONF.CONDU. | IRRITAB.PAR. | REPR.EAGGR. | RIF.RUO.CAS. | TRSCUR.PART. | LÜSCHER | M.A.S | S.D.S | COSCI.DI.SÈ | ESPRES.EMO. | AUTONOMIA | AUTOSTIMA | CAPARELAZ. | CAP.ASCOLTO | Q.E.MEDIA |
|--|--|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------|----------|-------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|
| SOMATIZZAZIONI | ASSENTI PRESENTI | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,05 | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,05 |
| INTENSITÀ DEL DOLORE | LIEVE MODERATO FORTE | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. |
| FREQUENZA DI CONPARSA | OCCASIONALE COSTANTE | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,05 | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. |
| DISTRETTO INTERESSATO | RACHIDE CERVICALE E ARTI SUPERIORI | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. |
| | RACHIDE DORSALE E LOMBOSACRALE | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. |
| | DISTRETTO ADDOMINALE E PELVICO | p < 0,05 | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,025 | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. |
| | ARTI INFERIORI | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,05 | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,001 |
| | INTERESSAMENTO GENERALE DI TUTTO IL CORPO O DI PIÙ DISTRETTI | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,05 | N.S. | N.S. | p < 0,025 | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. |

Tab 25b. Analisi della presenza, della intensità, della frequenza di comparsa e della localizzazione delle somatizzazioni algiche rispetto ai punteggi significativi emersi nelle scale psicometriche (P.A.R.I.-LÜSCHER-M.A.S. - S.D.S. -Q.E.).

| UTENTI FIORI DI BACH | | | UTENTI PSICHICI | | UTENTI SOMATICI | | UTENTI RELAZION. | | TOTALE | |
|-------------------------|-----------|----------|--------------------|------|--------------------|------|---------------------|------|--------|------|
| | | | N° | % | N° | % | N° | % | N° | % |
| FLORITEST POSITIVO | p < 0,025 | PRESENTE | 55 | 56,1 | 30 | 30,6 | 13 | 13,3 | 98 | 81,7 |
| | | ASSENTE | 5 | 22,7 | 10 | 45,5 | 7 | 31,8 | 22 | 18,3 |
| PAURA | p < 0,001 | PRESENTI | 53 | 88,3 | 24 | 60,0 | 9 | 45,0 | 86 | 71,7 |
| | | ASSENTI | 7 | 11,7 | 16 | 40,0 | 11 | 55,0 | 34 | 28,3 |
| INCERTEZZA | p < 0,025 | PRESENTI | 48 | 80,0 | 24 | 60,0 | 10 | 50,0 | 82 | 68,3 |
| | | ASSENTI | 12 | 20,0 | 16 | 40,0 | 10 | 50,0 | 38 | 31,7 |
| DISINTERESSE | p < 0,001 | PRESENTI | 46 | 76,7 | 16 | 40,0 | 6 | 30,0 | 68 | 56,7 |
| | | ASSENTI | 14 | 23,3 | 24 | 60,0 | 14 | 70,0 | 52 | 43,3 |
| SOLITUDINE | N.S. | PRESENTI | 32 | 53,3 | 17 | 42,5 | 10 | 50,0 | 59 | 49,2 |
| | | ASSENTI | 28 | 46,7 | 23 | 57,5 | 10 | 50,0 | 61 | 50,8 |
| IPERSENSIBILITÀ | N.S. | PRESENTI | 43 | 71,7 | 23 | 57,5 | 9 | 45,0 | 75 | 62,5 |
| | | ASSENTI | 17 | 28,3 | 17 | 42,5 | 11 | 55,0 | 45 | 37,5 |
| DEPRESSIONE | p < 0,05 | PRESENTI | 44 | 73,3 | 20 | 50,0 | 10 | 50,0 | 74 | 61,7 |
| | | ASSENTI | 16 | 26,7 | 20 | 50,0 | 10 | 50,0 | 46 | 38,3 |
| ECCISSIVO ALTRUISMO | N.S. | PRESENTI | 29 | 48,3 | 13 | 32,5 | 7 | 35,0 | 49 | 40,8 |
| | | ASSENTI | 31 | 51,7 | 27 | 67,5 | 13 | 65,0 | 71 | 59,2 |

Tab 26. Riscontro tra la presenza, la quantità e il tipo, di atteggiamenti mentali negativi riscontrati al Floritest ed il tipo di utenza.

| SCALE M.M.P.I. FLORITEST E FIORI DI BACH | | Hs | D | Hy | Pd | Mf | Pa | Pt | Sc | Ma | Si | Media | In.PsicoPat | In.Ansia | In.Psicosi | In.Nevrosi | Aggressività | Forza Io |
|--|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|
| FLORITEST POSITIVO PER | <2 2-5 6-10 >10 | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,01 | p < 0,001 | N.S. | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,001 | N.S. | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,001 | N.S. | p < 0,001 |
| PAURA | | p < 0,01 | p < 0,001 | p < 0,01 | p < 0,001 | N.S. | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,001 | N.S. | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,001 | N.S. | p < 0,001 |
| INCERTEZZA | | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,001 | N.S. | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,05 | p < 0,01 | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,001 | N.S. | p < 0,001 |
| DISINTERESSE | | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,05 | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,01 | p < 0,001 |
| SOLITUDINE | | p < 0,025 | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,01 | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,05 | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,05 |
| IPERSENSIBILITÀ | | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,01 | p < 0,01 | N.S. | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,01 | N.S. | p < 0,01 | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,001 | N.S. | p < 0,001 |
| DEPRESSIONE | | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,001 | N.S. | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,001 | N.S. | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,001 | N.S. | p < 0,001 |
| ALTRUISMO | | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,05 | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,05 | N.S. |

Tab 27a. Correlazioni tra la presenza, la frequenza ed il tipo di fiori di Bach significativi al Floritest e i punteggi significativi delle scale psicometriche (M.M.P.I.).

| SCALE P.A.R.I.- LÜSCHER- M.A.S. - S.D.S. - Q.E. FLORITEST E FIORI DI BACH | | ATT.MARTIRE | CONF.CONTU. | IRRITAB.PAR. | REPRE.AGGR. | RIE.RUO.CAS. | TRESCUR.PART | LÜSCHER | M.A.S | S.D.S | COSCIEDI SÈ | ESPRES.EMO. | AUTONOMIA | AUTOSTIMA | CAPARELAZ. | CAPASCOLTO | Q.E. MEDIA |
|---|--------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| FLORITEST POSITIVO PER | <2 2-5 6-10 >10 | N.S. | p < 0,01 | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,001 | p < 0,001 | N.S. | N.S. | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,001 | N.S. | p < 0,001 |
| PAURA | | N.S. | p < 0,025 | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,001 | p < 0,001 | N.S. | N.S. | p < 0,01 | N.S. | p < 0,05 | N.S. | N.S. |
| INCERTEZZA | | N.S. | p < 0,025 | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,001 | N.S. | p < 0,001 | N.S. | p < 0,025 | N.S. | p < 0,01 |
| DISINTERESSE | | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,001 | p < 0,001 | N.S. | N.S. | p < 0,01 | p < 0,01 | p < 0,001 | N.S. | p < 0,01 |
| SOLITUDINE | | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,025 | p < 0,05 | p < 0,025 | N.S. | N.S. | p < 0,01 | p < 0,01 | N.S. | p < 0,025 |
| IPERSENSIBILITÀ | | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,01 | p < 0,001 | p < 0,01 | N.S. | p < 0,001 | p < 0,05 | p < 0,001 | N.S. | p < 0,01 |
| DEPRESSIONE | | N.S. | p < 0,01 | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | p < 0,001 | p < 0,001 | N.S. | N.S. | p < 0,001 | p < 0,01 | p < 0,01 | N.S. | p < 0,001 |
| ALTRUISMO | | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. | N.S. |

Tab 27b. Correlazioni tra la presenza, la frequenza ed il tipo di fiori di Bach significativi al Floritest e i punteggi significativi delle scale psicometriche (P.A.R.I.-LÜSCHER-M.A.S.-S.D.S.-Q.E).